

OBSERVAÇÕES SOBRE ALGUMAS AVES DO SUL DO BRASIL

KEYWORDS. Aves, Southern Brazil, new records.

A avifauna do sul do Brasil é uma das mais conhecidas no país, sobretudo graças as obras abrangentes de BELTON (1984, 1985) para o Rio Grande do Sul (RS) e de SICK *et al.* (1981) para Santa Catarina (SC). Nesta contribuição registra-se a ocorrência de espécies raras ou pouco conhecidas para esses Estados.

Anas leucophrys Vieillot, 1816 - marreca-de-coleira. Em 10.XII.1989, observamos um casal em um lago eutrófico, localizado 5km W de Capivari, Palmares do Sul, RS (30°07'S - 50°30'W, alt.: 10m). Poucas observações sobre esta espécie foram publicadas para o Rio Grande do Sul. BELTON (1984) menciona somente três registros neste século, todos do Sudeste do Rio Grande do Sul, um dos quais realizado durante o verão austral. E. P. Albuquerque (com. pessoal, 1992) registrou, em 11.VII.1976, um casal, na lagoa do Nicola, Estação Ecológica do Taim, (32°33'S/52°31'W - 32°34'S/52°33'W, alt.: 2m).

Leucopternis polionota (Kaup, 1847) - gavião-pombo-grande. Em 31. V. 1991, um exemplar foi observado no Morro da Igreja (28°07'S - 49° 27'W, alt.: 1806m), Parque Nacional de São Joaquim, São Joaquim, SC. A ave caçava em campo, à distância de um a dois quilômetros de uma mata. IHERING (1898, 1899) relatou a coleta de um exemplar no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina. Há registros de mais três observações, uma no Rio Grande do Sul (VOSS, 1982) e duas em Santa Catarina (SICK *et al.*, 1981). Embora seja considerada ave de floresta (SICK, 1985), sobrevoa o campo (VOSS, 1982).

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) - gavião-preto. No município de Bom Jesus, RS, observamos espécimens voando sobre campo: um destes a 7km W de Silveira, RS (28°38'S - 49°58'W, alt.: 1100m), em 15.VII.1989, e outro a 3km W de São José dos Ausentes, RS (28° 44'S - 50°05'W, alt.: 1200m), em 01.VI.1991. BELTON (1984) constatou a presença desta espécie em alguns pontos do Estado, mas não no extremo do Planalto, divisa com o Estado de Santa Catarina.

Hydropsalis brasiliana (Gmelin, 1789) - curiango-tesoura. Em 11.X.1991, localizamos um macho numa clareira do bosque ao leste da sede da Estação Ecológica do Taim (32°32'S - 52°32'W, alt.: 5m), Rio Grande, RS. O bosque é caracterizado pela presença de *Ficus organensis* (Miguel) Miguel e *Erythrina cristagalli* Linnaeus, mas parcialmente alterado por pastoreio de gado. Trata-se de ave comum em diversas regiões do interior do Rio Grande do Sul (BELTON, 1984). Com esta observação no Taim, confirma-se sua ocorrência no litoral do extremo sul do Estado.

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) - caneleiro-de-crista. Uma fêmea, identificada conforme descrição de DUNNING (1982) e NAROSKY & YZURIETA (1987), foi observada em 25.XII.1989, na copa de uma árvore, no vale do Arroio Araçá (29°09'S - 51°21'W, alt.: 200m), Progresso, RS. Esta espécie é um visitante estival; raramente observada no Rio Grande do Sul, tendo sido registrada, até o momento, apenas para as regiões do Planalto e da Serra do Sudeste (BELTON, 1985).

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) - triste-pia. Em 15.XII.1989, três exemplares, com plumagem de descanso, foram observados 25km NW de São Rafael, Quaraí, RS (30°18'S - 55°55'W, alt.: 200m), no oeste do Estado. Pousaram durante vários minutos sobre um arbusto a 40m de distância do arroio Pai-passo e se dedicaram à limpeza da plumagem, tendo sido identificados pelo desenho característico na cabeça. Esta ave

migratória da América do Norte passa o inverno boreal principalmente no norte da Argentina, sendo comum nos pantanais de Corrientes e Entre Rios, Argentina (RIDGLEY & TUDOR, 1989). Para o Rio Grande do Sul, há apenas uma observação realizada em 1914 (PINTO, 1944).

Habia rubica (Vieillot, 1817) - tiê-da-mata. Em 23 e 26.XII.1989, registramos a presença de um par e de suas vocalizações no subbosque denso de mata próxima à confluência do arroio Araçá com o rio Fão (29°09'S - 52°21'W, alt.: 200m), Progresso, RS. Como esse Thraupidae, frequentemente, oculta-se no interior da mata, dificilmente é observado. Até o momento, havia sido assinalado no RS apenas na mata do Parque Florestal Estadual do Turvo (ALBUQUERQUE, 1981) e nas escarpas centro-leste (BELTON, 1985).

Saltator similis D'Orbigny & Lafresnaye, 1837 - trinca-ferro de-asa-verde. Em 24 e 25.XII.1989, observamos um indivíduo em arbustos na orla da mata no vale do arroio Araçá (29°09'S - 52°21'W, alt. - 200m), Progresso, RS; foi identificado pela garganta branca, estria malar, e lista superciliar branca. Até o momento, foi constatada no nordeste do Rio Grande do Sul, onde ocorre sobretudo nas escarpas e para o oeste do Estado, especialmente na bacia do Rio Ibicuí (BELTON, 1985).

Agradecimentos. Ao Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) pelos auxílios concedidos. Trabalho realizado através do convênio da PUC/RS com a Universidade de Tübingen, Alemanha.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE, E. P. de. 1981. Lista preliminar das aves observadas no Parque Florestal Estadual do Turvo, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. *Roessléria*, Porto Alegre, 4 (1): 107-122.
- BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Pt. 1. Rheidae through Furnaridae. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.*, New York, 176 (4): 369-636.
- . 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Pt. 2. Formicariidae through Corvidae. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.*, New York, 180 (1): 1-242.
- Dunning, J. S. 1982. *South American land birds*. Newtown Square. Harrwood. 351p.
- IHERING, H. von. 1898. As aves do Estado de São Paulo. *Revta. Mus. Paul.*, São Paulo 3: 113-476.
- . 1899. As aves do Estado do Rio Grande do Sul. *Anuário do Estado do Rio Grande do Sul para o ano 1900*, Porto Alegre, 15: 113-154.
- NAROSKY, T. & YZURIETA, D. 1987. *Guia para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Buenos Aires, Asoc. Ornitológica del Plata. 340p.
- PINTO, O. M. de O. 1944. *Catálogo das aves do Brasil*. v.2. São Paulo, Secretaria da Agricultura, Indústria e comércio. 700p.
- RIDGLEY, R. S. & TUDOR, G. 1989. *The birds of South America*. v.1. Oxford University. 516p.
- SICK, H. 1985. *Ornitologia Brasileira*; uma introdução. v. 1. Brasília, Universidade de Brasília. 481p.
- SICK, H.; ROSÁRIO, L. A. & AZEVEDO, T. R. 1981. Aves do Estado de Santa Catarina. *Sellóvia*, Ser. Zool., Florianópolis, (1): 1-52.
- VOSS, W. A. 1982. Comunicação sobre a ocorrência do gavião-pombo, *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847), no município de Viamão, RS, Brasil. (Aves-Accipitridae). *Pesquisas*, Ser. Zool., São Leopoldo (33): 27-28.
- WILLIS, E. O. & ONIKI, Y. 1991. *Nomes gerais para as aves brasileiras*. São Paulo, Brasiliense, 79p.
- RAINER RADTKE¹ & ERICH WEBER²**. (1) Laboratório de Pesquisas Biológicas da Universidade de Tübingen na PUC/RS, Av. Ipiranga 6681, 90.610-001 Porto Alegre, RS, Brasil. (2) Lehrstuhl für Systematische Zoologie, Universität Tübingen, Auf der Morgenstelle 28, Tübingen, RF Alemanha.